



**COVID-19, пресек стања 22. септембар 2022. године**

	Крагујевац	Аранђеловац	Топола	Рача	Кнић	Баточина	Лапово	Шумадијски округ
Тестирано	612	96	28	11	24	34	14	<b>819</b>
Позитивно	82	12	6	3	5	4	5	<b>117</b>
% позитивних од броја тестираних	<b>13,40</b>	<b>12,50</b>	<b>21,43</b>	<b>27,27</b>	<b>20,83</b>	<b>11,76</b>	<b>35,71</b>	<b>14,29</b>
Број становника	175.716	42.766	19.858	10.226	12.595	10.747	7.009	<b>278.917</b>
Стопа/Број позитивних на 1000 становника	0,467	0,281	0,302	0,293	0,397	0,372	0,713	<b>0,419</b>
Укупно позитивних од почетка пандемије	83.945	15.713	6.352	3.040	5.144	4.198	2.442	<b>120.834</b>

Укупно тестираних од почетка пандемије 484.289  
% позитивних од броја тестираних 24,95%

**Хоспитализација у УКЦ Крагујевац**

Број хоспитализованих пацијената УКЦ Крагујевац у 6.52 , 22.09.2022.год.	0
Број пацијената на респиратору у УКЦ Крагујевац, 22.09.2022.год.	0
Број отпуштених пацијената на дан, 21.09.2022.год.	7
Број пацијената прослеђених у Ковид болницу Крушевац на дан, 22.09.2022.год.	0

**Вакцинација на дан: 22. септембар 2022. године**

	Вакцина	1. доза	2. доза	3. доза	4. доза
Шумадијски округ	Fajzer Biontek	0	0	3	0
	Sputnjik	0	0	0	0
	AstraZeneka	0	0	0	0
	Moderna	0	0	0	0
	Sinofarm	0	0	0	3

**Обухват имунизацијом, 22. септембар 2022. године  
цела популација све вакцине (%)**

	1. доза	2. доза	3. доза	4. доза
Шумадијски округ	<b>44,84</b>	<b>43,65</b>	<b>26,47</b>	<b>1,07</b>
Аранђеловац	37,55	36,59	21,90	0,95
Баточина	31,64	31,01	19,53	1,22
Кнић	32,76	32,41	20,98	0,74
Крагујевац	<b>50,37</b>	<b>49,01</b>	<b>29,62</b>	1,24
Лапово	36,26	35,53	22,55	0,47
Рача	30,36	28,76	17,06	0,06
Топола	37,19	36,34	22,19	0,75

У кућну самоизолацију су стављени:

**1. Сви новоинфицирани од COVID-19**

**Кућна самоизолација за новоинфициране траје 7 дана.**

## Препоруке:

\*Избегавање контакта са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура);

\*Избегавање окупљања и боравка у простору где се налази велики број особа;

\*Појачана и честа хигијена руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју;

\*Ношење маски преко уста и носа уколико се борави у затвореном простору или на отвореном простору уколико није могуће обезбедити удаљеност од 1,5 метар (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски превоз и сл.);

\*Придржавање мера заштите од преношења инфекције код свих особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (ношење маске, респираторна хигијена – одржавање одстојања од других особа од најмање 1,5 метар, покривање уста и носа приликом кашљања или кијања папирним марамицама или рукавом у прегибу лакта, често прање руку).

\*У складу са закључком Стручног комитета за имунизацију, са састанака одржаних 3.2. и 18.2.2022. године, другу бустер дозу вакцине против ковид 19 могу примити све особе узраста 18 година и старије, код којих је од давања прве бустер дозе прошло најмање пет месеци, при чему се друга бустер доза првенствено препоручује код:

1. особа са примарним и секундарним имунодефицијенцијама које су у оквиру примовакцинације примиле само две дозе вакцине и бустер дозу након тога;
2. особа старијих од 60 година;
3. особа запослених у здравственим установама које раде на пословима приликом којих долазе у контакт са пацијентима.

Оставља се могућност да особа која се вакцинише изабере врсту вакцине која ће бити примењена као друга бустер доза.