



COVID-19, пресек стања 17. март 2023. године

| | Крагујевац | Аранђеловац | Топола | Рача | Кнић | Баточина | Лапово | Шумадијски округ |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Тестирано | 402 | 35 | 10 | 4 | 12 | 20 | 4 | 487 |
| Позитивно | 40 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57 |
| % позитивних од броја тестираних | 9,95 | 28,57 | 10,00 | 50,00 | 16,67 | 5,00 | 25,00 | 11,70 |
| Број становника | 175.716 | 42.766 | 19.858 | 10.226 | 12.595 | 10.747 | 7.009 | 278.917 |
| Стопа/Број позитивних на 1000 становника | 0,228 | 0,234 | 0,050 | 0,196 | 0,159 | 0,093 | 0,143 | 0,204 |
| Укупно позитивних од почетка пандемије | 90.905 | 16.863 | 6.850 | 3.171 | 5.655 | 4.594 | 2.593 | 130.631 |

Укупно тестираних од почетка пандемије 596.012
% позитивних од броја тестираних 21,92%

Хоспитализација у УКЦ Крагујевац

| | |
|---|---|
| Број хоспитализованих пацијената УКЦ Крагујевац у 6,49, 17.03.2023.год. | 4 |
| Број пацијената на респиратору у УКЦ Крагујевац, 17.03.2023.год. | 0 |
| Број отпуштених пацијената на дан, 16.03.2023.год. | 3 |
| Број пацијената прослеђених у Ковид болницу Крушевац на дан, 17.03.2023.год | 0 |

Вакцинација на дан: 17. Март 2023. године

| | Вакцина | 1. доза | 2. доза | 3. доза | 4. доза | 5. доза |
|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Шумадијски округ | Fajzer Biontek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sputnjik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AstraZeneka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sinofarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Spikevax bivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Comirnaty/omicron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

**Обухват имунизацијом, 17. март 2023. године
цела популација све вакцине (%)**

| | 1. доза | 2. доза | 3. доза | 4. доза | 5. доза |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Шумадијски округ | 47,61 | 43,65 | 28,41 | 1,18 | 0,04 |
| Аранђеловац | 39,21 | 38,35 | 22,85 | 1,04 | 0,04 |
| Баточина | 33,15 | 32,6 | 20,22 | 1,33 | 0,02 |
| Кнић | 33,87 | 33,46 | 21,61 | 0,80 | 0,02 |
| Крагујевац | 53,94 | 52,72 | 32,20 | 1,37 | 0,04 |
| Лапово | 38,32 | 37,72 | 23,62 | 0,49 | 0 |
| Рача | 31,59 | 30,09 | 17,81 | 0,10 | 0 |
| Топола | 38,11 | 37,3 | 22,98 | 0,78 | 0,03 |

У кућну самоизолацију су стављени:

1. Сви новиинфицирани од COVID-19

Кућна самоизолација за новиинфициране траје 7 дана.

Препоруке:

*Избегавање контакта са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура);

*Избегавање окупљања и боравка у простору где се налази велики број особа;

*Појачана и честа хигијена руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју;

*Ношење маски преко уста и носа уколико се борави у затвореном простору или на отвореном простору уколико није могуће обезбедити удаљеност од 1,5 метар (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски превоз и сл.);

*Придржавање мера заштите од преношења инфекције код свих особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (ношење маске, респираторна хигијена – одржавање одстојања од других особа од најмање 1,5 метар, покривање уста и носа приликом кашљања или кијања папирним марамицама или рукавом у прегину лакта, често прање руку).

*У складу са закључком Стручног комитета за имунизацију, са састанака одржаних 3.2. и 18.2.2022. године, другу бустер дозу вакцине против ковид 19 могу примити све особе узраста 18 година и старије, код којих је од давања прве бустер дозе прошло најмање пет месеци, при чему се друга бустер доза првенствено препоручује код:

1. особа са примарним и секундарним имунодефицијенцијама које су у оквиру примовакцинације примиле само две дозе вакцине и бустер дозу након тога;
2. особа старијих од 60 година;
3. особа запослених у здравственим установама које раде на пословима приликом којих долазе у контакт са пацијентима.

Оставља се могућност да особа која се вакцинише изабере врсту вакцине која ће бити примењена као друга бустер доза.