



COVID-19, пресек стања 19.06.2023. године

	Крагујевац	Аранђеловац	Топола	Рача	Кнић	Баточина	Лапово	Шумадијски округ
Тестирано	220	42	16	5	20	14	0	317
Позитивно	1	0	0	0	0	0	0	1
% позитивних од броја тестираних	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
Број становника	175,716	42,766	19,858	10,226	12,595	10,747	7,009	278,917
Стопа/Број позитивних на 1000 становника	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
Укупно позитивних од почетка пандемије	92,326	17,251	6,923	3,215	5,727	4,648	2,635	132,725

Укупно тестираних од почетка пандемије
% позитивних од броја тестираних

623,407
21,3%

Хоспитализација у УКЦ Крагујевац

Број хоспитализованих пацијената УКЦ Крагујевац у 7,00, 19.06.2023.год.	4
Број пацијената на респиратору у УКЦ Крагујевац, 19.06.2023.год.	1
Број отпуштених пацијената на дан, 18.05.2023.год.	0
Број пацијената прослеђених у Ковид болницу Крушевац на дан, 19.06.2023.год	0

Вакцинација на дан: 19.06.2023. године

	Вакцина	1. доза	2. доза	3. доза	4. доза	5. доза
Шумадијски округ	Fajzer Biontek	0	0	0	0	0
	Sputnjik	0	0	0	0	0
	AstraZeneka	0	0	0	0	0
	Moderna	0	0	0	0	0
	Sinofarm	0	0	0	0	0
	Spikevax bivalent	0	0	0	0	0
	Comirnaty/omicron	0	0	0	0	0

**Обухват имунизацијом, 19.06.2023. године
цела популација све вакцине (%)**

	1. доза	2. доза	3. доза	4. доза	5. доза
Шумадијски округ	47.61	43.65	28.41	1.18	0,04
Аранђеловац	39.21	38,35	22.85	1.04	0.05
Баточина	33.15	32,6	20.22	1.33	0,02
Кнић	33.87	33,46	21.61	0.80	0,02
Крагујевац	53.95	52,72	32.20	1.37	0.05
Лапово	38.32	37,72	23.62	0.49	0
Рача	31.59	30,09	17.81	0.11	0
Топола	38.11	37,3	22.98	0.78	0,03

У кућну самоизолацију су стављени:

1. Сви новоинфицирани од COVID-19

Кућна самоизолација за новоинфициране траје 7 дана.

Препоруке:

*Избегавање контакта са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура);

*Избегавање окупљања и боравка у простору где се налази велики број особа;

*Појачана и честа хигијена руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју;

*Ношење маски преко уста и носа уколико се борави у затвореном простору или на отвореном простору уколико није могуће обезбедити удаљеност од 1,5 метар (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски превоз и сл.);

*Придржавање мера заштите од преношења инфекције код свих особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (ношење маске, респираторна хигијена – одржавање одстојања од других особа од најмање 1,5 метар, покривање уста и носа приликом кашљања или кијања папирним марамицама или рукавом у прегибу лакта, често прање руку).

*У складу са закључком Стручног комитета за имунизацију, са састанака одржаних 3.2. и 18.2.2022. године, другу бустер дозу вакцине против ковид 19 могу примити све особе узраста 18 година и старије, код којих је од давања прве бустер дозе прошло најмање пет месеци, при чему се друга бустер доза првенствено препоручује код:

1. особа са примарним и секундарним имунодефицијенцијама које су у оквиру примовакцинације примиле само две дозе вакцине и бустер дозу након тога;
2. особа старијих од 60 година;
3. особа запослених у здравственим установама које раде на пословима приликом којих долазе у контакт са пацијентима.

Оставља се могућност да особа која се вакцинише изабере врсту вакцине која ће бити примењена као друга бустер доза.